療法名 tri-weekly DTX

適応 胃癌

抗癌剤適応分類 進行･再発癌

第2版	2022年2月
登録番号	胃－10
登録年月日	2013年1月

投与順	抗癌剤名（一般名）	【略語】	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	タキソテール® （ドセタキセル）	DTX	60mg/㎡	点滴静注	1時間	d1

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
DTX	60mg/㎡	↓																													

1コース期間 （次のコースまでの標準期間）	3週(1投2休)
総コース数	PDまで
コース間での休薬規定	なし

減量規定･中止基準	チェックリスト参照
投与量の増量規定	なし
投与間隔の短縮規定	なし
コースによる変化	なし
1日の中での抗癌剤投与順	単剤のためなし
プレメディケーション	デキサメタゾン注6.6mg
ポストメディケーション	なし

主な副作用とその対策	骨髄抑制、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心･嘔吐、下痢、発熱など
患者条件	チェックリスト参照
除外規定	チェックリスト参照
実施上の注意点	骨髄抑制がd5～14に生じやすいため、その間に採血検査を行うことが望ましい

備考	なし
治療成績	(PhaseⅡ studyより)奏効率23.7%、生存中央値27.1週
その他	なし

参考文献 南江堂 リスク別 がん化学療法レジメン 改訂第2版