

療法名 3wDTX

適応 乳癌
 抗癌剤適応分類 進行・再発癌、術後補助化学療法、術前補助化学療法

第2版	2022年2月
登録番号	乳-4
登録年月日	2013年1月

投与順	抗癌剤名(一般名)	【略語】	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	タキソテール® (ドセタキセル)	DTX	70mg/m ²	点滴静注	1時間	d1

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
DTX	70mg/m ²	↓																					

1コース期間 (次のコースまでの標準期間)	3週(1週投薬2週休薬)
総コース数	術前術後:4コースまで 進行・再発:浮腫・末梢神経障害強くなければPDまで
コース間での休薬規定	チェックリスト参照

減量規定・中止基準	チェックリスト参照
投与量の増量規定	1回の最高投与量は75mg/m ²
投与間隔の短縮規定	1日短縮可能
コースによる変化	なし
1日の中での抗癌剤投与順	単剤のためなし
プレメディケーション	投与当日デキサメタゾン注6.6mg
ポストメディケーション	なし

主な副作用とその対策	チェックリスト参照
患者条件	チェックリスト参照
除外規定	チェックリスト参照
実施上の注意点	①投与回数が増えるに従い、浮腫が発現しやすくなる ②ステロイドの前投与は、浮腫の発現を遅らせる ③添付溶解液にはエタノールが含まれているので、アルコール過敏の患者では生理食塩液または5%ブドウ糖にて直接溶解する

備考	なし
治療成績	①術後補助: FNCLCC PACS 01 試験(vs FEC単独群)よりFEC後DTX投与の5年生存率、5年無再発生存率における上乗せ効果が証明されている ②進行・再発:(Phase IIより) 適格症例で奏効率48.2%(67/139)、アンスラサイクリン既治療例で奏効率 47.8%(44/92)
その他	なし

参考文献 南江堂 リスク別 がん化学療法レジメン 改訂第2版
 タキソテール®総合製品情報概要 2010年度版
 じほう がん化学療法ワークシート 第3版