療法名 **3wABR**

適応 乳癌

抗癌剤適応分類 進行・再発癌

| 第1版 | 改訂なし |
|---|---|
| 登録番号 | 乳-11 |
| 登録年月日 | 2013年12月 |

| 投与順 | 抗癌剤名（一般名） | 【略語】 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アブラキサン®<br>（アブラキサン） | ABR | 260mg/㎡ | 点滴静注 | 30分 | d1 |

| | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 260mg/㎡ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 1コース期間<br>（次のコースまでの標準期間） | 3週(1週投薬2週休薬) |
| 総コース数 | 浮腫・末梢神経障害強くなければPDまで |
| コース間での休薬規定 | チェックリスト参照 |

| | |
|---|---|
| 減量規定・中止基準 | チェックリスト参照 |
| 投与量の増量規定 | 低用量から始めて、認容性によっては増量可能（メーカー回答） |
| 投与間隔の短縮規定 | 1日短縮可能 |
| コースによる変化 | なし |
| 1日の中での抗癌剤投与順 | 単剤のためなし |
| プレメディケーション | デキサメタゾン注9.9mg、クロルフェニラミン注1A、5-HT3拮抗薬1A点滴静注 |
| ポストメディケーション | なし |

| | |
|---|---|
| 主な副作用とその対策 | チェックリスト参照 |
| 患者条件 | チェックリスト参照 |
| 除外規定 | チェックリスト参照 |
| 実施上の注意点 | ①起壊死性薬剤のため、血管漏出に注意する。<br>②懸濁液には生理食塩水を使用する。（その他の薬剤と混合不可）<br>③アルブミン含有のためインラインフィルターは使用しない。<br>④アルブミン含有のため血液製剤使用記録を20年間保存すること。<br>⑤滴下速度安定のため、ポンプは使用しない。 |

| | |
|---|---|
| 備考 | なし |
| 治療成績 | 海外第Ⅲ相試験（CA012-0試験)においてパクリタキセルに対する非劣性が証明されている。<br>奏効率ABR群24%(55/229)：PTX群11.1%(25/225) |
| その他 | なし |

参考文献　アブラキサン®適正使用ガイド